

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

- Πάρτε δείγμα αίματος από τον ασθενή σε **δύο σωληνάρια** (αιματολογικό-βιοχημικό) από **ελεύθερη περιφερική φλέβα**. Στείλτε τα στην Αιμοδοσία με το **παραπεμπτικό διασταύρωσης συμπληρωμένο** σε κάθε πεδίο και **υπογεγραμμένο** ολογράφως από τον **υπεύθυνο ιατρό**.
- **Γρήγορη** επικοινωνία με την Αιμοδοσία για προτεραιότητα της επείγουσας διασταύρωσης.
Τηλ:2811/ 2815/ 2813
- **Εξηγήστε** τη διαδικασία στον ασθενή και εξασφαλίστε τη **συγκατάθεσή** του
- Αν υπάρχει αμφιβολία κατά την **επισκόπηση** της μονάδας (θολερότητα, αλλοίωση χροιάς) επικοινωνήστε με την Αιμοδοσία.
- **Επιβεβαιώστε τα στοιχεία ασθενούς – μονάδας- ετικέτα διασταύρωσης-ημερ. λήξης αίματος.**
- **Υπογραφή** του παραγώγου και του βιβλίου μεταγγίσεων από ιατρό.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

- **Ζωτικά σημεία ασθενούς**
 1. πριν τη μετάγγιση
 2. 15 λεπτά μετά την έναρξη
 3. μετά το τέλος της κάθε μετάγγισης
- Ανακινήστε καλά τη μονάδα πριν τη μετάγγιση
- Εφαρμόστε συσκευή μετάγγισης αίματος άσηπτα
- Χρησιμοποιείτε φίλτρο λευκαφαίρεσης σε επιλεγμένες κατηγορίες ασθενών / ερωτείστε τον ιατρό
- Μη λευκαφαιρείτε τα ήδη λευκαφαιρεμένα στην Αιμοδοσία συμπυκνωμένα ερυθρά.
- **Έγχυση τα πρώτα 15 λεπτά με βραδύ ρυθμό.**
- Χορήγηση μονάδων **ερυθρών** μέσα σε **2 ώρες**. Μέγιστος χρόνος χορήγησης **οι 4 ώρες**.
- Χορήγηση **αιμοπεταλίων** μέσα σε **15-30 λεπτά**, **FFP** σε **60 λεπτά**.
- **Φάρμακα ή διαλύματα δε πρέπει να προστίθενται στο αίμα ή να χορηγούνται ταυτόχρονα στην ίδια γραμμή εκτός από φυσιολογικό ορό. OXI RINGERS - D/W 5% - Ca++ - ANTIBΙΩΣΗ**
- Αντικαταστήστε το σύστημα αίματος σε κάθε φιάλη ή κάθε 12 ώρες και σε κάθε αλλαγή παραγώγου.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

- **Παρατηρείστε** τον ασθενή και αναφέρετε άμεσα κάθε δυσχέρεια παρουσιάζει
- **Επιστρέψετε** στην Αιμοδοσία ότι δεν χρησιμοποιήθηκε.
- **Μη κρατάτε** τα παράγωγα αίματος στα ψυγεία της κλινικής ή στους πάγκους νοσηλείας
- Σε περίπτωση **αντίδρασης επιστρέψτε τη μονάδα μαζί με τη φόρμα αντίδρασης συμπληρωμένη** μαζί με **δείγμα αίματος** από τον ασθενή σε **δύο σωληνάρια** (αιματολογικό-βιοχημικό) .
- Πετάξτε τους άδειους ασκούς και τα συστήματα αίματος στη κίτρινη σακούλα για αιματηρά υλικά.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

- Για την **παραλαβή** παραγώγων απαιτείται το **παραπεμπτικό παραλαβής**.
- Αποφεύγετε νυκτερινές μεταγγίσεις.
- Κάθε τρεις ημέρες καινούργιο δείγμα ορού για διασταύρωση.

Το τμήμα Αιμοδοσίας είναι κοντά σας για να παρέχει συνεχή και ασφαλή προμήθεια αίματος και παραγώγων όπου πραγματικά χρειάζεται. Η μετάγγιση είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία γι αυτό η εκτίμηση οφέλους–κινδύνου πρέπει να γίνεται σωστά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ