

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΠΙΠΛΟΚΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

1. Πυρετική αντίδραση

- Ρίγος και υψηλός πυρετός
- Ταχυκαρδία
- Κεφαλαλγία
- Ναυτία και εμετός
- Ερυθρότητα προσώπου

- Διακόψτε άμεσα τη μετάγγιση, ενημερώστε τον θεράποντα ιατρό και το τμήμα αιμοδοσίας
- Θερμομετρήστε τον ασθενή μισή ώρα μετά την εμφάνιση ρίγους & χορηγήστε αντιπυρετικά για την ελάττωση του πυρετού
- Σε ήπια αντίδραση μπορεί να συνεχιστεί η μετάγγιση μετά από ιατρική οδηγία+στενή παρακολούθηση του αρρώστου.

2. Αλλεργική αντίδραση

- Κνίδωση
- Ερυθρότητα προσώπου
- Ρίγος και πυρετός
- Ασθματικός συριγμός
- Οίδημα λάρυγγα

- Διακόψτε τη μετάγγιση
- Ενημερώστε το γιατρό
- Ακολουθήστε τις ιατρικές οδηγίες

3. Αιμολυτική αντίδραση

- Ρίγος και υψηλός πυρετός
- Έντονος πόνος στην οσφύ
- Ανησυχία
- Αίσθημα πληρότητας στο κεφάλι και ερυθρότητα προσώπου
- Ναυτία και εμετοί
- Συσφικτικός προκάρδιος πόνος, διάταση των φλεβών του τραχήλου
- Ταχυκαρδία-Ταχύπνοια-Δύσπνοια-Shock
- Μακροσκοπική αιματοουρία-Ολιγουρία-Ανουρία
- Αιμορραγία από το τραύμα ή το σημείο φλεβοκέντησης

- Διακόψτε τη μετάγγιση
- Ενημερώστε το γιατρό
- Καταγράψτε προσλαμβανόμενα και αποβαλλόμενα υγρά
- Χορηγήστε οξυγόνο για την αντιμετώπιση της δύσπνοιας
- Στείλτε στην αιμοδοσία τη φιάλη του αίματος και δείγμα πρόσφατου αίματος για επανέλεγχο συμβατότητας
- Απαλλάξτε τον ασθενή από το άγχος και την ανησυχία
- Ακολουθήστε τις ιατρικές οδηγίες

4. Υπερφόρτωση κυκλοφορίας

- Δυσφορία
- Δύσπνοια με μορφή ταχύπνοιας
- Βήχας παραγωγικός
- Ταχυκαρδία
- Κεντρική κυάνωση
- Διάταση των φλεβών του τραχήλου υγρούς ρόγχους στις βάσεις των πνευμόνων
- Πνευμονικό οίδημα

- Διακόψτε τη μετάγγιση
- Ενημερώστε το γιατρό
- Τοποθετήστε τον άρρωστο σε ανάροπη θέση
- Παρακολουθήστε στενά τα ζωτικά σημεία του ασθενή
- Ακολουθήστε τις ιατρικές οδηγίες

5. Σημαιμία

- Υψηλό πυρετό και ρίγος
- Έντονη κεφαλαλγία και /ή κοιλιαλγία
- Έντονη ερυθρότητα προσώπου
- Εμετοί ή αιματηρή διάρροια
- Καταπληξία
- Σπασμοί και κώμα

- Διακόψτε τη μετάγγιση
- Ενημερώστε το γιατρό
- Ζητήστε καλλιέργειες από το αίμα του δότη
- Αντιμετωπίστε την σηψαιμία σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες

6. Αναφυλακτική αντίδραση

- Γενικευμένη ερυθρότητα
- Βρογχόσπασμος με κοπιώδη αναπνοή
- Οπισθοστερνικός πόνος
- Λαρυγγικό οίδημα
- Καταπληξία
- Απώλεια συνείδησης

- Διακόψτε τη μετάγγιση
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αρχίσει πάλι η μετάγγιση
- Ενημερώστε το γιατρό
- Ακολουθήστε τις ιατρικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση επινεφρίνης, κορτικοστεροειδών και οξυγόνου